

1923 PRC). **23b.** Štrbské Pleso (Jos. Dostál 1936 PRC). – Malá Studená dolina (Kyselová et Šoltéssová 1978 TNP). – Velická dolina, Kvetnica (Spudilová 1956 PR). **23c.** Dolina Siedmich prameňov (Holubyho dol) (Domin 1925 PRC). – Kobyly vrchy, údolie J od kóty 1244 (Müller 1946 BRNU). – Vyšná Kobylárka, Tokárska dolina (Domin 1935 PRC). – pod Podkošiarimi (Domin 1935 PRC). – Tatranská Javorina, pod Havranom (Májovský 1968 SLO). – Ždiar (Domin 1933 PRC). – Dolina Hlbokého potoka (Hadač 1956 PR). **23c./29.** Tatranská Kotlina (Domin 1935 PRC; 1937 NI, PRC). **24.** Červený Kláštor (Domin 1932 PRC). – Lesnícký les (Májovský 1953 SLO). – Haligovce, Haligovské skaly (Domin 1932 PRC). **28.** Radoľa, Koscielisko (Letz 2010 SAV). – Tvrdošín, železničná stanica. – Trstená, železničná stanica (obe Letz 2011 SAV). – Klin, rašelinisko (Šípošová 2009 SAV). – Zubrec (Májovský 1954 SLO). – Habovka (Bernátová 1978 BBZ). **29.** Mníšek nad Popradom, Vysoký grúň (Chrtek et Deylová 1985 PR). **30a.** Prešov (Hazslinszky s. d. BP). **30b.** Čergov (Májovský 1960 SLO). **30c.** Komárany SV (Letz 2009 SAV). – Bardejov, časť Kúpele, Stavenec (Záborský 1972 SLO). – Bardejov, Kamenná hora (Záborský 1971 SLO). – Rokytovec SV, údolie potoka Rokytovec (Letz 2011 SAV). **30c./20.** Dlhé nad Cirochou (Májovský 1968 SLO). **31.** Príslp, dolina Dara (Soják 1960 PR). – Stakčín JV, kopec medzi dolinami Ofchovec a Trnovec (Letz 2011 SAV).

## 6. *Cerastium brachypetalum* Desp. ex Pers.

### Rožec krátkolupienkový

*Cerastium brachypetalum* Desp. ex Pers. Syn. Pl. 1, p. 520, 1805.

Jednoročná, 7–30(–40) cm vysoká bylina. Koreň niťovitý, rozkonárený. Byľ jedna alebo na báze rozkonárená do riedkeho trsu viacerých byľí, vzpriamená alebo vystúpavá, rovnovážne alebo šikmo nahor odstávajúco husto chlpatá až vlasatá, s chlpmi do 1,7(–2,5) mm dlhými a tiež s početnými kratšími chlpmi; na báze byle chlpy nežliazkaté, na horných internódiách chlpy žliazkaté, vzácne nežliazkaté alebo len nežliazkaté; žliazky na vrchole chlpor podlhovasto oválne; byľ aj s listami sivozelená až žltozelená, niekedy tmavšia a purpurovo červenkastá. Listy prízemnej ružice obrátene vajcovité až lopatkovité, v dolnej tretine často zúžené do stopky, na vrchole zaokrúhlené, s nasadenou špičkou, na líci riedko až husto nežliazkatato chlpaté, na rube holé alebo s roztrúsenými chlpmi; byľové listy elipsovité, vajcovité až široko kopijovité, tupé alebo končisté, špičkaté, 5–15(–20)×2–7 mm veľké, 1,5–3-krát dlhšie ako široké, na špičke často s tmavočervenou škvrnou, z oboch strán husto pokryté dlhými sivými chlpmi, výrazne presahujúcimi okraje listov, na báze chlpy odstávajúce, až 2,5 mm dlhé. Listene bylinné, podobné listom (bez blanitého vrcholu), o niečo menšie než najvyššie byľové listy, z oboch strán husto chlpaté. Súkvetie 3–50(–70)-kveté, riedke alebo husté, konáre husto pokryté žliazkatými a/alebo nežliazkatými chlpmi. Kvetné stopky vzpriamené alebo jemne do boku odstávajúce, v čase zrelosti plodov iba pod kalichom o ca 90° ohnuté, husto rovnovážne až šikmo odstávajúco chlpaté, so žliazkatými a/alebo nežliazkatými chlpmi; stopka primárneho kvetu v čase zrelosti plodov 8–17(–23) mm dlhá, 2–4,5-krát dlhšia ako ka-